

Problematiche di Benessere – Tabella fattrici

Benessere fisico

Questione relativa al benessere	Problema	Soluzione
Stabulazione in gabbia	Mancanza di spazio per l'attività fisica e per l'espressione di comportamenti specie-specifici Altezza insufficiente per alzarsi sulle zampe posteriori	Recinti al coperto senza copertura superiore o sistemi estensivi all'aperto. Garantire uno spazio orizzontale sufficiente (almeno 4500 cm ² /coniglio) e nessun limite di altezza imposto dalla presenza di coperture superiori.
Carenza di fibre nell'alimentazione	Scarsa salute dentale e disfunzioni intestinali	Accesso costante a fieno, erba o leguminose (come l'erba medica) – sfusi, in rastrelliera o in cilindretti compressi
Comfort ambientale inadeguato	Pavimentazione in rete metallica	Evitare pavimentazione in rete metallica. Tra le alternative, plastica, gomma, doghe di bambù, o lettiera di paglia su pavimentazione solida (comporta ricambio frequente per la prevenzione delle malattie)
Condizioni termiche inadeguate	Stress da calore	Sistemi di ventilazione che mantengano la temperatura al di sotto dei limiti di benessere per i conigli (<25°C); spazio sufficiente per rinfrescarsi (per es. in posizione coricata) nei climi più caldi
Tassi di rimonta alti	Le cause principali sono infertilità e mastiti, disturbi intestinali e respiratori	Fornire condizioni igieniche e ventilazione adeguate
Morbilità alta	Scarsa igiene. Tra le malattie, coccidiosi e pasteurellosi, disturbi respiratori, parassitosi e infezioni fungine	Ambiente igienico e ben ventilato, pulito in profondità tra una partita e l'altra. Per prevenire la coccidiosi, si può ricorrere a coccidiostatici
Lesioni e ferite	Lesioni al garretto Dermatiti plantari Aggressività	Evitare pavimentazione in rete metallica. La stabulazione di gruppo delle fattrici aumenta l'aggressività degli animali. Garantire una disponibilità di spazio adeguata e controllare continuamente i problemi di aggressività
Mortalità delle nidiate	Cuccioli uccisi da altre fattrici	Le fattrici devono avere spazi individuali per il parto e le prime fasi dell'allattamento

Benessere mentale

Questione relativa al benessere	Problema	Soluzione
Noia	Ambienti spogli	Arricchimento ambientale, per esempio con piattaforme sopraelevate, tubi e materiali da rosicchiare e masticare
Stabulazione individuale separata (fattrici e maschi da riproduzione)	Isolamento sociale, stress	Le fattrici si possono stabulare in gruppo, con una gestione prudente e uno spazio sufficiente per diminuire l'incidenza di aggressioni
Paura	Scarsa familiarità con gli esseri umani, rumore e confusione, ambiente unico e vuoto	Per ridurre la paura dell'uomo, stabilire un contatto discreto con i conigli fin dalla più tenera età. Fornire un ambiente arricchito con piattaforme sopraelevate e tubi dove nascondersi. Ridurre al minimo il rumore ambientale
Impossibilità di regolare il comportamento materno	Impossibilità di accedere alla nidiata o di evitare i cuccioli quando necessario	Le fattrici devono avere libero accesso alla nidiata e devono anche poter evitare i cuccioli in via di svezzamento, per esempio rifugiandosi su piattaforme a loro riservate per il riposo

Comportamento naturale

Questione relativa al benessere	Problema	Soluzione
Comportamenti anomali	Morsi alle gabbie, gli animali si strappano il pelo	Condizioni di stabulazione stimolanti, disponibilità di arricchimento ambientale
Aggressività	Aggressioni tra fattrici adulte o tra maschi da riproduzione	Per le fattrici, ridurre gli episodi mantenendo stabili i gruppi, separandole in corrispondenza del parto e fornendo vie di fuga per sfuggire alle aggressioni. I maschi devono essere stabulati in un gruppo di fattrici o separati, ma garantendo il contatto visivo
Comportamento specie-specifico limitato	Isolamento sociale	Stabulazione in gruppo – gestita con attenzione – delle fattrici, con spazi sufficienti a prevenire fenomeni gravi di aggressioni