



# Problematiche di benessere – Tabella scrofe

## Benessere fisico

| Questione relativa al benessere                                  | Problema  | Soluzione  |
|--|---|--|
| Confinamento – gabbie parto, gabbie di allattamento, posta fissa | Lesioni alle spalle, debolezza muscolare e ossea, problemi cardiovascolari, distocia, infezioni urinarie  | Stabulare le scrofe in gruppo durante le fasi di inseminazione, gravidanza e parto   |
| Zoppia – incidenza media del 10%                                 | Pavimentazione inadeguata, specie se totalmente fessurata; pavimenti bagnati e scivolosi  | Lettiera di paglia per le zone di decubito e pavimento di gomma per quelle riservate alla posizione stazionaria; scolo dei liquidi efficiente  |
| Condizioni fisiche non buone                                     | Competizione per il cibo, alimentazione inadeguata  | Lo spazio alla mangiatoia deve garantire che tutte le scrofe mangino contemporaneamente; spargere il cibo anche sul pavimento, su un'area grande; nei sistemi automatizzati, prevedere un numero sufficiente di postazioni   |
| Condizioni non confortevoli                                      | Assenza di lettiera; spazio a disposizione scarso   | Lettiera di paglia profonda e spazio sufficiente, da calcolare in base all'equazione allometrica   |
| Condizioni termiche inadeguate                                   | Stress termico al coperto<br>Scottature all'aperto  | Ventilazione e controllo della temperatura<br>Fornire ripari e zone d'ombra e stagni/pozze in cui sguazzare (perché le scrofe si rinfreschino e si proteggano la pelle)  |
| Mastite, metrite, agalassia                                      | Infezioni batteriche alle ghiandole mammarie e all'utero; l'agalassia causa alta mortalità fra i lattonzoli e peso insufficiente allo svezzamento | I recinti per il parto devono essere puliti e asciutti; le scrofe devono fare attività fisica anche prima del parto e nelle prime fasi di lattazione; acqua ad libitum; le scrofe non devono ingrassare eccessivamente   |
| Lesioni alle mammelle  | Competizione tra i lattonzoli; le mammelle che danno latte non sono sufficienti   | Le dimensioni della figliata devono essere sostenibili e tenere conto delle condizioni della scrofa. La scrofa deve nutrirsi adeguatamente e ai lattonzoli si deve fornire cibo supplementare. Avvicinare manualmente i lattonzoli alle mammelle. Per aumentare la produzione di latte, fare in modo che le scrofe abbiano spazio a sufficienza per muoversi |
| Visite veterinarie   | Malattie e problemi di salute, se diagnosticati in tempo, si possono curare meglio  | Sviluppare una strategia per il monitoraggio di malattie e indicatori di benessere; stabilire obiettivi e azioni per ridurre l'incidenza di problemi di salute   |

**Benessere mentale**

| Questione relativa al benessere                                  | Problema  | Soluzione  |
|--|---|--|
| Confinamento – gabbie parto, gabbie di allattamento, posta fissa | Noia, frustrazione, depressione   | Stabulare le scrofe in gruppo durante la gravidanza e non confinarle durante la lattazione   |
| Ambiente spoglio   | Noia, aggressività, stereotipie   | Substrati complessi, commestibili e distruttibili (per es. paglia, lolla di riso); arricchimenti ambientali  |
| Paura  | Gli individui sottomessi nella gerarchia sociale hanno paura di avvicinarsi al gruppo e agli individui dominanti<br><br>Distanza di fuga alta, paura degli uomini | Barriere e ripari, vie di fuga dagli individui aggressivi. Mantenere i gruppi stabili ed evitare di mischiare individui non abituati a stare insieme<br><br>Interazioni positive con gli uomini, movimentazione degli animali attraverso paratie e barriere, senza il ricorso a pungoli elettrici; comportamento calmo e prevedibile |
| Fame   | La restrizione dell'alimentazione nelle prime fasi di gravidanza, per evitare che ingrassino troppo, scatena aggressività   | Alimentazione ricca di fibre: il foraggio <i>ad libitum</i> aumenta il senso di sazietà  |
| Anelli al naso negli allevamenti all'aperto                      | L'animale non può grufolare, prova dolore   | È una pratica da evitare. Rotazione del pascolo frequente, spazio a disposizione sufficiente   |

**Comportamento naturale**

| Questione relativa al benessere                             | Problema  | Soluzione   |
|---|---|---|
| Comportamenti anomali                                       | Stereotipie: l'animale morde e mastica le sbarre della gabbia   | Stabulare le scrofe in gruppo; substrati complessi, commestibili e distruttibili (per es. paglia, lolla di riso); arricchimenti ambientali  |
| Aggressività  | Lesioni cutanee e zoppie  | Nella stabulazione in gruppo, fornire spazio a sufficienza, lettiera morbida e vie di fuga dalle scrofe aggressive; cibo <i>ad libitum</i> . Mantenere il più possibile i gruppi stabili  |
| L'espressione dei comportamenti specie-specifici è limitata | Spazio insufficiente per l'individuazione di reparti funzionali al coperto<br><br>Le scrofe non possono costruire il nido | Calcolare lo spazio necessario tramite l'equazione allometrica. Reparti distinti per mangiare, defecare, riposarsi e fare attività fisica<br><br>Fornire materiale adatto prima e dopo il parto<br><br>Usare sistemi di allattamento libero |